

**Racip**®

راسب

### شکل دارویی: شربت خوراکی

ترکیبات (در هر ۵ میلی لیتر):

سیپروهپتادین هیدروکلراید ۲ میلی گرم- لیوکاربیتین ۱۲۲/۳ میلی گرم- لیزین هیدروکلراید ۱۲۰ میلی گرم- ویتامین B1 ۱۵ میلی گرم ویتامین B6 ۱ میلی گرم- ویتامین B12 ۲۵ میکروگرم.

## موارد مصرف و آثار درمانی :

درمان بی اشتهانی در کودکان و بالغین مبتلا به اختلالات فیزیولوژیک عاطفی یا ارگانیک، بی اشتهانی متعاقب بیماری های عفونی، سوء تغذیه، تاخیر در رشد، بی اشتهانی در اطفال، استفراغ های دائمی، ناپایداری های عاطفی هنگامی که همراه با علائم بی اشتهانی باشد، بی اشتهانی در بزرگسالان، لاغری های مربوط به اختلالات مزاجی، کمک به تولید انرژی و کمک به پیشگیری و درمان تبخال (به دلیل وجود لیزین).

الف) راهنمایی‌های عمومی:

قبل از معرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به هریک از اجزاء تشکیل دهنده فرمول ، آنتی هیستامین ها و یا هر ماده غذایی دیگر.
  - در صورت ابتلاء به بیماری هایی نظیر گلوکوم ، سابقه احتباس ادراری
  - در نوزادان نازه مولد شده

ب) مصرف در دوران بارداری و شیر دهی:

معرف دارو در دوران بارداری و شیردهی با صلاح‌دید پزشک صورت می‌گیرد (گروه B).

ب) مقدار و نحوه مصرف دارو:


کودکان ۱ تا ۷ سال: ۵ میلی لیتر: دو بار در روز قیل از غذا

کودکان بالای ۷ سال: ۱۰ میلی لیتر، دو بار در روز قبل از غذا

بیزدگسالان: ۱۵ میلی لیتر، سه بار در روز قبل از غذا.

## ت ) عوارض جانبی:

شایعترین عارفه خواب الودگی می‌باشد.



ث) مسمومیت دارویی:

در غلظت‌های درمانی معمولاً عارضه‌ای مشاهده نمی‌شود.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد، فرد مسموم را سریعاً به بخش مسمومین بیمارستان منتقل کنید.

ح شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از بین زدگی، محافظت کنید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

ج) بستہ بندی:

شرکت داروسازی رها سپروهپتادین، اسید آمینه و ویتامین های گروه ب را با نام تجاری راسیپ® و به شکل شربت خوارکی در ظروف از جنس PET . ۲۰۰ میلی لیتری به همراه پیمانه و بروشور درون چوبه عرضه می کند.

