



Vita globin™

راهنمای مصرف

محلول خوراکی ویتاگلوبین (با طعم پرتقال)

Liquid tonic

محلول خوراکی ویتاگلوبین با ترکیبی کاملاً متعادل از ویتامین ها و مواد معدنی مانند ویتامین B12، ویتامین C و روی (زنک) جهت حذب بیتر آهن فرموله شده است.

بن محصول در تقویت سیستم ایمنی نقش داشته و برای رشد و نمو ضروری می باشد.

محلول خوراکی ویتاگلوبین حاوی کلیه ریزمعنی های مورد نیاز در فرایند خون سازی از قبیل آهن است که برای تشکیل گلیول های قرمز افزایش سطح ارزی ضروری می باشد. آهن انتقال دهنده اصلی اکسیژن در بدن است. ویتامین C موجود در محلول خوراکی ویتاگلوبین به جذب بیتر آهن کمک می کند. سیانوکوبالامین (ویتامین B12) نیز برای رشد، تقسیم سلولی، خون سازی و عملکرد سلول های عصبی ضروری است.

ترکیبات خون ساز تشکیل دهنده محلول خوراکی ویتاگلوبین برای همه سنین مناسب است. در افراد مسن و ورزشکاران به بهبودی سریع تر بافت ها کمک می کند. برای زنان نیز در دوران بارداری و قاعدگی مفید می باشد. محلول خوراکی ویتاگلوبین به رشد و عملکرد بیتر فکری و ذهنی کمک می نماید.

موارد مصرف

کمک به تامین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز کودکان و بزرگسالان
 کمک به درمان کم خونی، ضعف و کاهش انرژی

موارد منع مصرف

مصرف محلول خوراکی ویتاگلوبین در افرادی که به هر یک از مواد تشکیل دهنده این محصول حساسیت دارند و یا در افراد مبتلا به هموکروماتوز و هموسیدروز ممنوع می باشد

موارد احتیاط

مصرف سیانوکوبالامین (ویتامین B12) در افراد مبتلا به آتروفی عصب بینایی لبر طبق دستور پزشک یا با مقادیر توصیه شده مصرف نموده و از مصرف بیش از اندازه خودداری شود.

شرایط نگهداری

پس از هر بار استفاده در بطری را کاملاً بسته، داخل جعبه، در مکان خشک و خنک (دماهی زیر ۳۰ درجه سانتیگراد)، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری کنید.
 از بخ زدگی محصول جلوگیری نمایید.

توجه

پیش از مصرف به آرامی تکان دهید

بسته بندی

بطری کهربایی ۲۰۰ ملی لتری به همراه قاشق مدرج و برگ راهنمای در حجم مقوایی

ترکیبات

هر ۵ میلی لیتر حاوی:

ویتامین B1 (تیامین)
ویتامین B2 (ریبوفلاوین)
ویتامین B6 (پیریدوکسین)
ویتامین B12 (سیانوکوبالامین)
نیاسینامید
فولیک اسید
دی - پانتول
ویتامین C
کلیم گلیسروففات
فریک امونیوم سیترات
(نمایل ۱۰ میلی گرم آهن به صورت انتقال) زینک سولفات
(نمایل ۳ میلی گرم روی (ریسک) به صورت انتقال) مسکر
مس
آل-ایزین

دستور مصرف پیشنهادی

۱ تا ۳ سال: ۲/۵ میلی لیتر ۲ بار در روز
 ۴ تا ۱۲ سال: ۵ میلی لیتر ۲ بار در روز
 بزرگسالان (زنان و مردان): ۵ میلی لیتر ۳ بار در روز یا طبق دستور پزشک از قاشق مدرج داخل جعبه استفاده کنید.

این فرآورده سرفاکتمل رژیمی نعده ای بوده و هب سعی در جای بستگیری از سماری نمی باشد

