

نداخلات دارویی:

مصرف همزمان این فرآورده با وارفارین و داروهای مشابه و همچنین داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی از جمله آزاتیوپورین، بازیلیکسیمب، داکلیزومب، موروموناب-سی دی^۳، سیکلوسپورین، مایکوفنولات، تاکرولیموس، سیرولیموس و کورتیکواستروئیدها، می‌باشد با احتیاط و تحت نظر پزشک معالج صورت گیرد.

عوارض جانبی:

مانند سایر فرآورده‌ها، این فرآورده نیز ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشد. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، اما در صورت بروز عوارض، زیر با نیزشک با داروساز مشورت نمایید.

- عوارض جانبی غیر شایع (بیشتر از ۱۰۰۰ نفر در ۱۰۰ نفر): مشکلات گوارشی مانند معده درد، سوزش سردن، تهوع، اسهال، استفراغ و مشکل در بلع.
 - عوارض جانبی نادر (بیشتر از ۱ نفر در ۱۰۰۰۰ نفر اما کمتر از ۱ نفر در ۱۰۰۰ نفر): خونریزی ملایم از لثه‌ها و بینی، واکنش‌های آلرژیک مانند راش پوستی، کهیو، خارش پوست و غشای موکوسی.
 - عوارض جانبی بسیار نادر (۱ نفر و یا کمتر از ۱ نفر در ۱۰۰۰ نفر): واکنش‌های شدید حساسیتی، همراه با تورم صورت، تنگی نفس و افت فشار خون.

شرایط نگهداری:

فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نماید.

فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
این فرآورده تا ۶ ماه پس از باز نمودن درب بطری قابل استفاده است.

سته بندی:

شریت پلاروکا توسط شرکت داروسازی فارانشیمی تولید شده و هر بطری در یک جعبه به همراه یک برگه راهنمای قرار می‌گیرد.

ساخت شرکت داروسازی فاران شیمی

پژوهشگاه علوم انسانی و اسلام‌شناسی، خیابان خدامی، میدان عطاء، خیابان نیروی انتظامی

Digitized by srujanika@gmail.com

وب سایت: www.pelaroka.com | تلفن: ۰۷۹۶۱۳۹۹ | پرسش: ۰۷۹۶۱۳۹۹

وب سایت: www.pelaroka.com | تلفن: ۰۵۷۹۶۱۳۹۹ | مدرس: سید علی

وب سایت: www.pelaroka.com | مس ۹۹۳۱۴۸۷۵۰

مقدار و نحوه مصرف: پلاروکا را مطابق آنچه در این برگه راهنمای توضیح داده شده است مورد استفاده قرار دهید. مصرف معمول این فرآورده به شرح ذیل است مگر اینکه پزشک شما دستور مصرف درگیری، انتخوبن کرده باشد:

بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال: ۷/۵ میلی لیتر، سه بار در روز
کودکان ۶-۱۲ سال: ۵ میلی لیتر، سه بار در روز
مصرف این فرآورده در کودکان زیر ۶ سال توصیه نمی شود.

قال، از مصرف، بطری را خوب تکان دهید.

به منظور جلوگیری از عود مجدد علائم، مصرف این فرآورده را ۲ الی ۳ روز پس از بهبود کامل ادامه دهید.

درمان بیش از ۲ هفته توصیه نمی‌شود.
در صورت فراموشی یک نوبت از مصرف فرآورده به محض یادآوری دوز فراموش شده را مصرف نمایید و دوز بعدی را طبق روال معمول ادامه دهید. اما اگر تقریباً زمان دوز بعدی فرارسید از مصرف دوز فراموش شده خودداری نمایید و دوز بعدی را نیز دوربرابر نسازید.
دصفه صرف مصروف بیش از مقدار توصیه شده، با برشک با داروساز تماس بگیرید.

مصنف در دهان، بارداری و شیردهی

مطالعات کافی و کنترل شده در مورد مصرف این فرآورده طی دوران بارداری و شirdesh، انجام نشده است لذا مصرف آن طی این دوران توصیه نمی شود.

هشدارها و احتیاط:

- در صورت بدتر شدن علائم یا عدم بهبودی طی ۱ هفته یا بروز تنگی نفس، مشاهده خون در خلط و تب پایدار، فوراً با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
 - در صورت بروز علائمی مانند زردی چشم‌ها و پوست، تهوع، استفراغ، ادرار تیره، دردهای شکمی، خستگی غیرطبیعی و از دست دادن اشتها، مصرف فرآورده را فوج قطع کرده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
 - این فرآورده ممکن است خطر خونریزی دارد. اقدامات جراحی را افزایش دهد بنابراین از جراحی، استفاده از آن را متوقف نمایید.