

شربت کولیک میگسچر[®]

شکل دارویی :

شربت ۱۲۰ میلی لیتر در جعبه مقوایی
اجزا، فرآورده در هر ۵ میلی لیتر :

عصاره خشک زنجیبل ۲/۵ میلی گرم

عصاره خشک رازیانه ۲ میلی گرم

استاندارد شده بر اساس ۰.۰۲ درصد جینجرول

موارد مصرف:

کمک به درمان ناراحتی و درد نفخ و اسپاسم های گوارشی ناشی از
کولیک ، دندان درآوردن و سکسکه در نوزادان و کودکان
دستور مصرف :

کودکان صفر تا یک ماه نصف قاشق مرباخوری (۲/۵ میلی لیتر)

کودکان یک تا شش ماه یک قاشق مرباخوری (۵ میلی لیتر)

کودکان بالای شش ماه ۲ قاشق مرباخوری (۱۰ میلی لیتر)

بزرگسالان ۳۰ میلی لیتر

هنگام تغذیه یا بعد از تمام شدن تغذیه ، میل شود.

حداکثر مقدار مجاز مصرف ، ۶ بار در شبانه روز می باشد.


قبل از مصرف ، شیشه را به خوبی تکان دهید.

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر :

میوه رازیانه به دلیل دارا بودن آنه تول موجب کاهش یا توقف اسپاسم های دستگاه گوارش و تشدید ترشح شیرابه های گوارشی و در نتیجه آسان شدن هضم غذا می شود.
از جمله آثار فارماکولوژیک زنجیبل کاهش ترشح اسید معده می باشد.

این خصوصیات فارماکولوژیک بر روی ترکیبات موجود در زنجیبل از جمله ۶-۱۰ - ۱۰-۶ - دهیدروجینجر دی اون، ۶-۹ - ۱۰ - جینجر دی اون، زینجبیرن و ... مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است.

ترکیبات گیاهی موجود در این شربت قادر به کاهش انقباض اسفنکتر ازوفاز و در نتیجه آزادسازی هوای محبوس شده هستند و همچنین از طریق اثر آتاکونیستی روی یون کلسیم موجب شل شدن عضلات صاف چداره روده بزرگ می شوند.



عوارض جانبی :

رازیانه موجود در فراورده ممکن است در بعضی از افراد باعث بروز واکنش آлерژیک در پوست و سیستم تنفسی شود.

صرف این فراورده در کسانی که حساسیت به رازیانه، هویج کرفس و به طور کلی سابقه حساسیت به گیاهان خانواده چتریان دارند توصیه نمی شود.

تداخلات دارویی :

این شربت با داروهای ضد انعقاد، عوامل ضد پلاکت، هپارینهای کوتاه زنجیره و عوامل ترومبوლیتیک تداخل اثر دارد.

این فراورده با آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین تداخل دارد لذا از صرف همزمان این دو دارو خودداری کنید.

موارد عدم صرف و نکات قابل توصیه:

به علت اثرات تحریک کننده ترشح صفرا در بیماران مبتلا به سنگ صفرا از صرف این فراورده خودداری شود.

زنگبیل اثر مهار کننده ستنز ترموبوکسان داشته لذا از صرف این دارو در بیمارانی که در آنها خطر خونریزی وجود دارد خودداری شود.

صرف این دارو در کودکانی که دچار نارسایی قلبی هستند حتماً با نظر پزشک انجام شود. وجود رسوب در شربت به علت وجود عصاره های گیاهی، طبیعی است.

۴ هفته پس از باز نمودن درب بطری، از صرف شربت خودداری نمایید. پس از باز نمودن درب شربت، در یخچال نگهداری شود.

در نوزادان زیر ۱ ماه، زنان باردار و شیرده با مشورت پزشک از شربت استفاده شود.

صرف طولانی مدت و بیش از مقادیر توصیه شده از شربت باید با نظر پزشک صورت گیرد. شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز نمودن در دارو، در یخچال نگهداری شود.

رفرنس مورد استفاده :

۱- Natural medicine comprehensive data base

۲- PDR گیاهی

۳- فارماکوپه گیاهی ایران