

کولیف بی اس کی®

▪ در صورت بروز حساسیت به دارو یا احتمال وقوع آن از مصرف خودداری نموده و به پزشک اطلاع دهید.

▪ در صورتی که علیرغم مصرف صحیح دارو، علائم بیماری تداوم یافته باشد پزشک خود را مطلع نمایند.

▪ هنگام تهیه محصول از عدم باز هدگی قبلی درب آن اطمینان حاصل نموده، در غیر این صورت از مصرف خودداری گردد.

▪ قبل از مصرف به تاریخ انقضای مندرج بر روی بسته بندی و محصول توجه نمایید.

عارض جانی: مصرف این دارو عوارض جانبی خاصی به دنبال نداشته است، با این حال در موارد نادر احتمال بروز واکنش های آلرژیک (به ویژه مربوط به رازیانه) وجود دارد.

مصرف در بارداری و شیردهی: مصرف این دارو عمده برای رده های سنی اطفال و کودکان است و مطالعات کافی در خصوص مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی صورت نگرفته، لذا مصرف این دارو در این دوران پیشنهاد نمی گردد.

شرایط نگهداری:

- پس از هبیار استفاده، درب ظرف حاوی دارو را کاملاً بسته، داخل جعبه و در درمانی کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از رطوبت نگهداری شود.
- از بین زدگی دارو محافظت گردد.
- دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

منابع:

1. Martindale 38th edition, 2014.
2. Drug Facts and Comparisons 2015 edition.
3. Natural Medicine Comprehensive Database, 13th edition, 2013.
4. PDR for herbal medicine, 4th edition, 2008.
5. USPDI drug information for the healthcare professional, 27th edition, 2007.

قطره خوارکی مخصوص نوزادان و کودکان جهت بهبود نفخ و کولیک

بسته بندی و شکل دارویی:

بسته بندی حاوی قطره خوارکی ۳۰ میلی لیتری به صورت سوسپنسیون خوارکی به همراه قطره چکان و برگ راهنمایی باشد.

اجزا و مواد تشکیل دهنده:

هر میلی لیتر حاوی:

سایمیتیکون ۴۰ میلی کرم

روغن شوید ۰۰۰۵ میلی لیتر

روغن رازیانه ۰۰۰۷ میلی لیتر

سایر اجزا؛ روغن نعنای (طمدم دهنده) و سیدم ساخارین (شیرین کننده)

دستور مصرف: به صورت خوارکی طبق دستور پزشک و یا جدول زیر مصرف شود. زمان مصرف، ۱۵ دقیقه قبل از وعده غذایی می باشد.

گروه سنی	میزان مصرف پیشنهادی
کمتر از ۶ ماه	روزانه ۳ بار، هر بار ۱۲ قطره
۶-۱۲ ماه	روزانه ۳ بار، هر بار ۱۹ قطره
بیش از ۱ سال	روزانه ۳ بار، هر بار ۲۵ قطره

* هر میلی لیتر کولیف بی اس کی ۲۵ قطره می باشد.

موارد مصرف:

▪ از بین بردن نفخ و گازهای اختیاصل یافته در مجرای گوارش

▪ برطرف نمودن دردهای شکمی و کولیک نوزادی

اثرات درمانی و فارماکولوژی:

سایمیتیکون کشن سطحی را کاهش می دهد و در صورت مصرف خوارکی منجر به یکی شدن حباب های گاز درون مجرای گوارش شده و به انتشار آن ها کمک می کند. این ترکیب برای تسکین نفخ شکم و ناراحتی های شکمی ناهمی از گازهای گوارشی مازاد مفید می باشد و در مشکلاتی مثل سوء هاضمه، ریفلاکس معده به مری، نفخ بعد از جراحی، بلع هوا، کولون اسپاستیک و تحریک پذیر، زخم معده و دایبورتیکولوژیس مصرف می شود. علاوه بر سایمیتیکون، این قطره حاوی روغن شوید و رازیانه است که برای بهبود مشکلات معده و روده به خصوص نفع و کولیک موثر بوده و باعث می شوند قطره کولیف بی اس کی از نظر طعم برای نوزادان و کودکان خوشابند و قابل پذیرش باشد.

تداخلات:

تاکنون تداخلات دارویی خاصی برای این محصول گزارش نشده است.

موارد منع مصرف:


حساسیت به رازیانه. افراد حساس به کرفس و هویج ممکن است به رازیانه لیز واکنش حساسیتی نشان دهند و نباید در این افراد لیز مصرف شود.

موارد احتیاط و هشدار:

▪ چنانچه هر داروی دیگری مصرف می کنید، قبل از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

▪ طبق دستور پزشک با مقادیر توصیه شده مصرف نموده و از مصرف مقادیر بیش از حد مجاز خودداری گردد.

▪ جهت بدست اوردن دوزهای دقیق مصرفی از قطره چکان استاندارد شده داخل بسته بندی استفاده نمایید.



بنیان سلامت کسری
BSK

دارنده بروانه ساخته شرکت بنیان سلامت کسری

WWW.BSKCO.IR

نهضان - ایران

صندوق پستی ۱۶۸۲۸۴۲۱

تلفن: ۰۲۱-۷۳۷۳۷۳۷۶

COLIEF[®]

Packaging and dosage form:

It contains 30 ml oral drop with a dropper and a patient information leaflet.

Ingredients:

Each ml of Colief BSK[®] contains:

Simethicone.....40 mg

Dill oil.....0.005 ml

Fennel oil.....0.0007 ml

Other ingredients: peppermint oil (flavoring agent) and sodium saccharin (sweetener).

How to use:

Administer orally as prescribed by doctor or based on the table below. Best time of administration is 15 minutes before meal.

Age Group	Recommended Dosage
Below 6 months	12 drops, 4 times daily
6 - 12 months	19 drops, 4 times daily
Over 1 year	25 drops, 4 times daily*

* Each ml of Colief BSK[®] contains 25 drops.

Indications:

- Relief from bloating and the gas trapped inside the gastrointestinal tract
- Reliable relief from abdominal pain and infantile colic

Pharmacological and clinical effects:

Simethicone lowers surface tension and when administered orally, causes bubbles of gas in the gastrointestinal tract to coalesce thus aiding their dispersion. This compound is used for the relief of flatulence and abdominal discomfort due to excess gastrointestinal gas in disorders such as dyspepsia, Gastroesophageal reflux disease, postoperative flatulence, air swallowing, spastic and irritable colon, gastric ulcers and diverticulosis. In addition to simethicone, this drop contains dill oil and fennel oil which are useful for relieving gastrointestinal disturbances specially flatulence and colic pain and makes Colief BSK[®] pleasant and acceptable for infants and children.

Interactions:

No certain reported drug interactions.

Contraindications:

Sensitivity to fennel. Do not use if any allergy to celery or carrots.

Precautions and warnings:

- Inform your doctor or pharmacist if you are taking other medicines.
- Administer as prescribed by your physician or recommended dosage and do not exceed the allowed amount.

- In order to obtain precise amounts, use calibrated dropper provided in the package.
- In case of allergic reactions, avoid administrating and inform your doctor.
- Inform your doctor if the symptoms persist despite of proper use of medicine.
- Do not use if the package is opened.
- Please check the expiry date before taking this medicine.

Adverse effects:

Taking this medicine has no important side effects. However in rare cases there is a risk of allergic reactions (especially by fennel).

Pregnancy and lactation:

This medication is mainly used for infants and children. There are insufficient studies about its use during pregnancy and breastfeeding, therefore it is not recommended.

Storage:

- Keep tightly closed in the original box, in a cool and dry place (below 30°C)
- Do not freeze.
- Keep out of reach and sight of children.

References:

- Martindale 38th edition, 2014.
- Drug Facts and Comparisons 2015 edition.
- Natural Medicine Comprehensive Database, 13th edition, 2013.
- PDR for herbal medicine, 4th edition, 2008.
- USPDI drug information for the healthcare professional, 27th edition, 2007.

